

LA SENSIBILISATION AU HPV

L'infection par un papillomavirus humain (HPV) est une **infection sexuellement transmissible**. Le plus souvent éliminée par l'organisme, l'infection peut persister. Lorsqu'elle est due à un papillomavirus à haut risque cancérogène, elle peut être à l'origine de lésions précancéreuses qui régissent spontanément ou peuvent évoluer en cancer¹. Ils touchent aussi bien les **hommes** que les **femmes**.



POURQUOI ÇA TOUCHE LA BOUCHE ?

« Le HPV est identifié comme cause de certains cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx, en particulier ceux de la base de la langue et des amygdales. Il se transmet lors de rapports sexuels oraux ».

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) estime **la part des cancers de l'oropharynx dus aux HPV entre 40% et 60%**².



POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE SE FAIRE VACCINER ?

Lorsqu'elle est effectuée avant le début de la vie sexuelle, **la protection conférée par le vaccin est proche de 100%**³.



QUELLES SONT LES MODALITÉS ?

Le vaccin peut être prescrit et administré par un médecin, une sage-femme, un pharmacien ou un infirmier. Il peut également être réalisé à l'hôpital, dans un Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), un centre de planification familiale et certains centres de vaccination publics. **Le vaccin est recommandé pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans révolus**. En rattrapage, il est recommandé pour les personnes des deux sexes de 15 à 19 ans révolus non encore vaccinées.



QUEL RELAI LE CHIRURGIEN-DENTISTE PEUT-IL EFFECTUER DANS SON CABINET DENTAIRE ?



Informier sur les risques de contamination



Informier sur les moyens de prévention



Orienter vers les lieux ressources



Détecter des lésions suspectes dans la bouche

